

КОМПЛЕКС АНАЛИЗОВ ПЕРЕД ИМПЛАНТАЦИЕЙ

- №1** АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парациальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время: Activated Partial tromboplastin time, АРТТ)
- №2** Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR)
- №3** Фибриноген (Fibrinogen)
- №4** Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III)
- №16** Глюкоза (в крови) (Glucose)
- №68** Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV AG/AB Combo)
- №69** Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест)
- №73** HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В, "австралийский" антиген)
- №79** Anti-HVC-total (антитела к антигенам вируса гепатита С)
- №194** Тромбиновое время (Thrombin Time)
- №1515** Клинический анализ крови, общий анализ: лейкоформула, СОЭ



**ПРИ НАЛИЧИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ
МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЛЕЧАЩЕГО ДОКТОРА**

ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ПЕРЕД АНАЛИЗОМ КРОВИ

Сдать кровь в утренние часы натощак (или в дневные и вечерние часы, спустя 4-5 часов после последнего приема пищи).

- Не принимать жирную пищу накануне анализа.
- Не принимать пищу за 8-12 часов до анализа.
- Запрещается употреблять сок, чай, кофе за 12 часов до сдачи анализов.
- По возможности отказаться от приема лекарств минимум за сутки до сдачи анализов.
- В день сдачи анализов не рекомендуется заниматься спортом.
- В день сдачи анализов рекомендуется исключить повышенные эмоциональные нагрузки.
- Воздержаться от употребления алкоголя в течение 72 часов до сдачи анализа.
- Не курить как минимум за 60 минут до сдачи анализа.

Анализы перед имплантацией зубов необходимы для оценки общего состояния здоровья. Они дают возможность исключить заболевания и состояния, при которых выполнение хирургического вмешательства противопоказано.

